



Consultorio Veterinario Bernades

Italia 1583 - Martínez - Buenos Aires - Argentina · (011) 4792-8971 / 4798-4414
 Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 20 hs. · sábados de 9 a 13 hs.
 bernades@bernades.com.ar · www.bernades.com.ar
 Consultas domiciliarias y por internet.

CANINOS

página 1 (única)

Indicaciones para Cirugía de Cataratas

Presentarse a cirugía el día a las horas.

dos días antes de la cirugía

TobraMax "Labyes" 1 gota cada 8 horas.
 (o en su defecto otro colirio de Tobramicina)

el día anterior a la cirugía

(separar las gotas por lo menos 5 minutos)

TobraMax "Labyes" 1 gota cada 8 horas.
 Diclovet "Paúl" 1 gota cada 8 horas.
 o Flurbiprofeno "Hollyday" (Voltarén, Tolerane)
 Atropina "Paraqueños" o "Love" 1 gota cada 12 horas.
 (Isoptoatropina)
 Prednisolona Plus "Love" 1 gota cada 8 horas.
 (Prednefrin Forte, Prednifarma)

el día de la cirugía

(separar las gotas por lo menos 5 minutos)

Ayuno de 12 horas. Retirar el agua 2 horas antes.
 TobraMax "Labyes" 1 gota cada 8 horas.
 Diclovet "Paúl" 1 gota cada 8 horas.
 o Flurbiprofeno "Hollyday"
 Atropina "Paraqueños" o "Love" 1 gota cada 12 horas.
 Prednisolona Plus "Love" 1 gota cada 8 horas.
 Rimadyl o Prednisolona 2 mg/kg cada 12 horas,
 1 mg/kg cada 24 horas
 (a las 7:00 AM con trozos de queso)

el post operatorio

(separar las gotas por lo menos 5 minutos)

Dorzolamida 2% "Holliday" (Trusopt) 1 gota cada 8 horas, durante **10 días**.
 TobraMax "Labyes" 1 gota cada 8 horas, durante **10 días**.
 Diclovet "Paúl" 1 gota cada 8 horas, durante **90 días**.
 Atropina "Paraqueños" o "Love" 1 gota cada 12 horas, durante **3 días**.
 Prednisolona Plus "Love" 1 gota cada 8 horas, durante **14 días**.
 Rimadyl o Prednisolona 2 mg/kg cada 12 horas,
 1 mg/kg cada 24 horas, durante **14 días**. Administrar con comida.
 Ante varios vómitos o diarrea, suspender.
 Collar isabelino **debe usarlo permanentemente**, durante **10 a 14 días**. Retírelo una vez al día y límpielo con agua y jabón. En ese momento debe permanecer bajo vigilancia directa. Si es necesario, puede limpiar los párpados con agua tibia. Evitar cualquier presión sobre el globo ocular. Cuidado con el contacto con otros animales.
1er. control profesional debe realizarse dentro de las 24 ó 48 horas.
Comuníquese inmediatamente si nota los ojos opacos, congestionados o con secreciones.
 Evaluación de la visión espere 10 a 20 días. Con el collar isabelino y la pupila dilatada parecen ciegos.

Ante cualquier duda llámenos.