



# Consultorio Veterinario Bernades

Italia 1583 - Martínez - Buenos Aires - Argentina · (011) 4792-8971 / 4798-4414  
 Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 20 hs. · sábados de 9 a 13 hs.  
 bernades@bernades.com.ar · www.bernades.com.ar  
 Consultas domiciliarias y por internet.

EQUINOS

página 1 (única)

## Indicaciones para Cirugía de Cataratas

Presentarse a cirugía el día  a las  horas.

### dos días antes de la cirugía

TobraMax "Labyes" 3~4 gotas cada 8 horas.  
 (o en su defecto otro colirio de Tobramicina)

### el día anterior a la cirugía

(separar las gotas por lo menos 5 minutos)

TobraMax "Labyes" 3~4 gotas cada 8 horas.  
 Diclovet "Paúl" 3~4 gotas cada 8 horas.  
 o Flurbiprofeno "Hollyday" (Voltarén, Tolerane)  
 Atropina "Paraqueños" o "Love" (Isoptoatropina) 1 gota cada 12 horas.  
 Prednisolona Plus "Love" (Prednefrin Forte, Prednifarma) 3~4 gotas cada 8 horas.

### el día de la cirugía

(separar las gotas por lo menos 5 minutos)

Ayuno de 12 horas. Retirar el agua 2 horas antes.  
 TobraMax "Labyes" 3~4 gotas cada 8 horas.  
 Diclovet "Paúl" 3~4 gotas cada 8 horas.  
 o Flurbiprofeno "Hollyday"  
 Atropina "Paraqueños" o "Love" 1 gota cada 12 horas.  
 Prednisolona Plus "Love" 3~4 gotas cada 8 horas.  
 Flunixin Meglubina 1 mg/kg cada 12 horas,  
 o Fenil Butazona 2,2 mg/kg cada 12 horas

### el post operatorio

(separar las gotas por lo menos 5 minutos)

Dorzolamida 2% "Holliday" (Trusopt) 3~4 gotas cada 8 horas, durante **10 días**.  
 TobraMax "Labyes" 3~4 gotas cada 8 horas, durante **10 días**.  
 Diclovet "Paúl" 3~4 gotas cada 8 horas, durante **90 días**.  
 Atropina "Paraqueños" o "Love" 1 gota cada 12 horas, durante **3 días**. Puede producir cólico paralítico. Controlar bosteo y borborismos.  
 Prednisolona Plus "Love" 3~4 gotas cada 8 horas, durante **14 días**.  
 Flunixin Meglubina 1 mg/kg cada 12 horas,  
 o Fenil Butazona 2,2 mg/kg cada 12 horas, durante **20 días**. En potrillos considerar gastroprotector.  
 Antibióticos sistémicos durante **5 días**.  
 Protección ocular evaluar uso de máscara protectora ocular.  
**1er. control profesional debe realizarse dentro de las 24 ó 48 horas.**  
**Comuníquese inmediatamente si nota los ojos opacos, congestionados o con secreciones.**  
 Evaluación de la visión espere 10 a 20 días. Con protector ocular y la pupila dilatada parecen ciegos.

Ante cualquier duda llámenos.